

**Etude de l'incidence des facteurs
psychologiques dans des FSR
sans cause décelable**

Isabelle CACHEUX

Thèse de Medecine 1996 PARIS

METHODOLOGIE

Utilisation du questionnaire « Désir d'enfant »
mis au point par S. Stoleru (Inserm unité 292)
pour différentes études sur les facteurs
psychologiques impliqués dans la stérilité
du couple et les échecs de FIV

Hum. Reprod. vol.8 n°7 pp.1039-1046, 1993

Ce questionnaire de 95 items étudie trois domaines:

- La motivation du désir d'enfant
- La vie sexuelle d'un point de vue qualitatif et quantitatif
- Les aspects de l'histoire familiale en lien avec la procréation

**En ce qui concerne l'infertilité du couple ,
trois facteurs ont été isolés comme
discriminant les couples fertiles et infertiles**

- Une faible intégration du désir d'enfant dans la vie relationnelle et sexuelle du couple
- Le peu de pensées et de rêveries associées au projet d'avoir un enfant
- Le faible niveau d'attente concernant la maternité

POPULATION DE RECHERCHE

**40 femmes enceintes de 16 semaines ayant
fait au moins 3 fausses-couches**

METHODOLOGIE (SUITE)

- 1^{ère} Observation des résultats d'ensemble du questionnaire
- 2nd Observation après 20 semaines avec la constitution de 2 groupes: FCS + = récursive
FCS - = poursuite de la grossesse
- Comparaison de la fréquence des réponses avec le test de Khi2

RESULTATS REMARQUABLES

- 38% d'antécédents d'au moins une FC chez la mère
- 20% d'anomalies graves ou de handicaps dans la petite enfance dans la famille proche ou étendue
- 35% ayant au moins enfant décédé avant 2 ans dans la famille proche ou étendue

Facteurs de risque

- Avoir eu son père ou sa mère ayant eu un autre enfant d'un autre partenaire
- Avoir peu souvent imaginé son mari en train de s'occuper de l'enfant avant sa naissance

- Avoir le plus souvent une absence de désir sexuel l'année précédent la grossesse
- Avoir le plus souvent eu une absence de relation sexuelle depuis le début de la grossesse

Facteurs pronostiques en faveur d'une différence entre FCS- et FCS+

- L'existence d'un handicap dans la famille
- Le père et la mère de la femme peu favorables à cette grossesse
- Le plus souvent le mari ne désire pas d'enfant

- Le plus souvent la femme a regretté à un moment de sa vie d'être enceinte
- Le moins souvent l'enfant a été imaginé pendant la grossesse actuelle et lors des rapports sexuels avant la grossesse actuelle

CONCLUSION

Comme dans les recherches de **S. Stoleru** sur l'infertilité du couple, cette recherche met en évidence certains facteurs psychologiques jouant un rôle dans les FCR qui concernent

- des éléments de l'histoire familiale et des relations aux parents
- des éléments concernant le couple dans sa vie sexuelle en relation au désir d'enfant
- des difficultés dans l'investissement de la grossesse

RECHERCHE GEMA

Nous nous intéressons aux couples ayant vécu un échec répétitif de leur projet d'enfant pour répondre à la question suivante :

Y a-t-il une fragilité psychique particulière chez l'un ou l'autre des partenaires du couple, en lien avec leur propre histoire, qui rendrait difficile la mise en place d'une « alliance de grossesse » dans le couple nécessaire à la sécurité affective de la femme qui s'engage dans une grossesse?