

GEMA

Groupe d'Etude de la Maladie Abortive

Définition des fausses couches spontanées répétées (FCSR) :

- 3 arrêts de grossesse avant 12 SA
- concerne 1% à 2% des couples désirant une grossesse
- la fréquence augmente avec le nombre d'accidents

GEMA

Groupe d'Etude de la Maladie Abortive

Fréquence des FCS

- risque de base : 12 % à 15 %
- après 2 FCS consécutives : 17 % à 35 % de 3^{ème} FCS
- après 3 FCS consécutives : 25 % à 46 % de 4^{ème} FCS
- après 6 FCS consécutives : >50 % de FCS

Prouve l'existence d'une maladie abortive : la probabilité de 3 FCS serait de 12³ % soit 1,7 pour 1000

Toute naissance entre deux FCS ramène le taux de récurrence au risque de base

GEMA

Groupe d'Etude de la Maladie Abortive

La maladie abortive est un facteur de risque de pathologie placentaire (RCIU, HTA, HRP) même en l'absence de syndrome APL

En cas de grossesse évolutive : augmentation des complications autres (diabète, placenta prævia, rupture prématurée des membranes)

GEMA

Groupe d'Etude de la Maladie Abortive

Protocole GEMA :

Bilan après 3 FCS successives avec le même partenaire

Entre 6 SA (ou β hCG > 5000 UI) et 12 SA

Patiente < 40 ans

Pas de traitement imposé